

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το **ΧΟΥΜΙΚΟ ΟΞΥ** σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης της GROW MORE, εφοδιάζει τα εδάφη με υψηλής συγκέντρωσης οργανικά χουμικά και φουλβικά οξέα, τα οποία βοηθούν αφ' ενός μεν στην αύξηση της περιεχόμενης οργανικής ουσίας, αφετέρου δε στην αύξηση της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων (C.E.C.), ειδικότερα των εδαφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(Διαλύστε το στο νερό πριν από την χρήση)
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

100-200 γραμ. ανά στρέμμα με την αντίστοιχη ποσότητα νερού, ή 500 γραμ. σε 200-400 λίτρα νερό.

Γεμίστε το δοχείο με νερό και μετά προσθέστε το HUMIC ACID.

Συνιστάται η εφαρμογή μία φορά τον μήνα κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Εφαρμόστε το μια φορά 3-4 εβδομάδες πριν από την ανθοφορία, μια φορά μετά την άνθηση και τέλος 2-3 εβδομάδες αργότερα, όταν οι καρποί έχουν μισοσχηματιστεί ή όταν αρχίσει η εκπτυξη της δευτερεύουσας βλάστησης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:

Εμβάπτιση των σπόρων για λίγο χρόνο σε διάλυμα HUMIC ACID 458, 1%.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ:

Εμβάπτιση της ρίζας των προς μεταφύτευση φυτών σε διάλυμα HUMIC ACID 458 1%.

EXPORT
Made in U.S.A.

GROW MORE



HUMIC⁴⁵⁸ **ACID**

100% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ

(ΧΟΥΜΙΚ ΑΣΙΝΤ 458)

(ΧΟΥΜΙΚΟ ΟΞΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ)

ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΗΓΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΧΟΥΜΟΥ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Χουμικό οξύ.....48 % β/β
Φουλβικό οξύ.....8,4 % β/β

ΕΜΑΦΑΝΙΣΗ: Σκούρου καφέ έως μαύρου χρώματος σκόνη.

pH: σε διάλυμα 1% 7-8

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ: 100%

 2,2 lbs (1 χλγ)

 10 X 2,2 kg (10 X 1 χλγ)

Batch No:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ:

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΜΠΕΚ, ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΛΠ.)

Συνιστάται για αλκαλικά και άλλα εδάφη:

200-300 γραμμάρια HUMIC ACID στο στρέμμα. Το HUMIC ACID της GROW MORE μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την σπορά των σπόρων ή σε συνδυασμό με τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται κατά τα πρώτα στάδια των μεταφυτεύσεων στις ίδιες πάντα αναλογίες.

Για φτωχά εδάφη, συνιστάται η διαβροχή του εδάφους με διάλυμα HUMIC ACID 1% ή χορήγηση του ίδιου διαλύματος μέσα από το δίκτυο άρδευσης (σταλλακτοφόροι, σπρίνκλερ κλπ).

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΟΡΕΨΗΣ

100-200 ppm (mg/L) Μέγιστη
συγκέντρωση 500 ppm

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Παράγεται και συσκευάζεται από τη
GROW MORE INC.,
15600 NEW CENTURY DRIVE,
GARDENA, CA 90248-2140 USA

Εισάγεται και διανέμεται
στην Ελλάδα από την
ΤΟΠΙΟ Α.Ε. 4ΧΛΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΤΟΛΟΥ
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΗΛ: 2752097635/37
FAX: 2752097636 e-mail: topio@otenet.gr