

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τομάτα, πιπεριά, μπρόκολο, κουνουπίδι, πεπόνι, αγγούρι:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή μετά την μεταφύτευση ή στο στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου. Επιπλέον 1 έως 2 διαδοχικές εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Μαρούλι, σέλινο, σπανάκι, αντίδια, καρότο, μαϊντανός και άλλες φυλλώδεις καλλιέργειες:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή μετά την μεταφύτευση ή στο στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου. Επιπλέον 1-2 εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Φασόλια και αρακάς, καλαμπόκι:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου. Επιπλέον 1-2 εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Φράουλες:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή μετά την μεταφύτευση. Διαδοχικές εφαρμογές κάθε 30 ημέρες ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Πατάτες, κρεμμύδια και άλλες βολβώδεις ή κονδυλώδεις καλλιέργειες:

Βελτιώνει το χρώμα του φυλλώματος όπως επίσης την ανάπτυξη των βολβών των κονδυλών. 220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή μετά την μεταφύτευση ή στο στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου. Επιπλέον 1-2 εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Επιτραπέζια σταφύλια:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο της ανθοφορίας. Στην συνέχεια διαδοχικές εφαρμογές στο στάδιο του γυαλίσματος και 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Περιέχει μεταξύ άλλων: Φωσφορώδες οξύ.

Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Πλύνεται τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνεται το δέρμα με νερό στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνεται.

Batch No:

GROW ↓ MORE

PHOS★☆☆★PRO®
CALCIUM Export
Made in U.S.A.

(ΦΟΣ ΠΡΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ)

0-16-0 + 4% Ca

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Φωσφόρος διαθέσιμος (P₂O₅).....16% w/w

Ασβέστιο (Ca).....4% w/w

pH.....1,5

E.C σε δ/μα 1%.....4



ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α : Ανόργανο λίπασμα κυρίου στοιχείου (P)

και δευτερεύοντος (Ca)

Αρ. Κυκλοφορίας : 60

Το Phos Pro είναι ένα μοναδικό συμπλήρωμα της θρέψης, το οποίο εξασφαλίζει στα φυτά φώσφορο και ασβέστιο υδατοδιαλυτή μορφή, είναι δε κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές ή για εφαρμογές στο έδαφος. Σωστά προγραμματισμένες εφαρμογές θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική επιθυμητή ανάπτυξη των φυτών, την βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της παραγωγής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαφυλλικές εφαρμογές:

220-450cc ανά στρέμμα σε 100-200 λίτρα νερό. Μην υπερβαίνετε συγκέντρωση 2% όγκο κατ' όγκο (2 λίτρα στα 100 λίτρα νερό).

Στο έδαφος:

350-450 cc ανά στρέμμα μέσα από τους σταλακτοφόρους. Η εφαρμογή του Phos Pro κοντά στους σπόρους μπορεί να τους ζημιώσει πράγμα που μπορεί να οφείλεται στην μείωση του pH κάτω από 6,5.

Σημείωση : Στις ετήσιες καλλιέργειες καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Phos Pro αναμένονται στις επόμενες της πρώτης καλλιέργειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Phos Pro συνδυάζεται με τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα και τα προϊόντα θρέψης. Όταν όμως ο συνδυασμός επιχειρείται για πρώτη φορά, συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή συνδυαστικότητας πριν την εφαρμογή στις καλλιέργειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΛΑΣΤΕΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τηλ: Κέντρου δηλητηριάσεων : 210-7797777

Αριθμός UFI: 0D10-C09R-T00Q-EK24

Παράγεται και συσκευάζεται από τη
GROW MORE INC.,
15600 NEW CENTURY DRIVE,
GARDENA, CA 90248-2140 USA
Εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την
ΤΟΠΙΟ Α.Ε. 4ΧΛΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΤΟΛΟΥ
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΗΛ: 2752097635/37
FAX: 2752097636 e-mail: topio@otenet.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κρασοστάφυλλα:

Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο του 5% της ανθοφορίας. Στην συνέχεια διαδοχικοί ψεκασμοί στο στάδιο του γυαλίσματος και 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Ακτινίδια, Σμέουρα κλπ.:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο λίγο πριν την ανθοφορία. Διαδοχικές εφαρμογές κάθε 30 ημέρες μέχρι την συγκομιδή ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Αμύγδαλα, καρύδια κλπ.

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο της πράσινης κορυφής. Διαδοχικές εφαρμογές κάθε 30 ημέρες μέχρι το γέμισμα των καρπών ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Δαμάσκηνα, νεκταρίνια και άλλα πυρηνόκαρπα :

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο της πράσινης κορυφής ή του ροδίσματος των μπουμπουκιών. Διαδοχικές εφαρμογές στο στάδιο της καρπώδεσης και 2-3 εβδομάδες πριν την συγκομιδή ή ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες.

Μήλα, αχλάδια και άλλα γιγαρτόκαρπα:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο φούσκωμα των οφθαλμών. Διαδοχικές εφαρμογές κάθε 30 ημέρες μέχρι την συγκομιδή ή ανάλογα με τις ανάγκες θρέψης.

Εσπεριδοειδή και αβοκάντος :

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο λίγο πριν την ανθοφορία. Διαδοχικές εφαρμογές στο μέσον της καλλιέργειας και 3-4 εβδομάδες πριν την συγκομιδή ή ανάλογα με τις ανάγκες θρέψης.

Ελιές:

220-450cc ανά στρέμμα και εφαρμογή. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο λίγο πριν την ανθοφορία. Διαδοχικές εφαρμογές στο μέσον της καλλιέργειας και 3-4 εβδομάδες πριν την συγκομιδή ή ανάλογα με τις ανάγκες θρέψης.

Να φυλάσσεται καλά κλεισμένο μακριά από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αραιώνεται με προσοχή σε νερό το προϊόν, για την παρασκευή ψεκαστικού υγρού.,

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

1 L (1,15 Kgr) 12 x 1 L (12X1,15 Kgr) 1 GAL (3,785 L.) (4,35 Kgr) 4X1 GAL (4X4,35 Kgr)