

GROW  MORE®**EXPORT**
Made in U.S.A.GROW  MORE®GROW  MORE®**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **Resyst**, είναι ένα οργανο- ανόργανο λίπασμα ιχνοστοιχείων και βιοδιεγέρτης του ριζικού συστήματος. Έχει σχεδιαστεί τόσο να διεγείρει το ριζικό σύστημα των φυτών όσο και για τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση της δραστηριότητας των ωφέλιμων βακτηρίων και των μυκήτων στην περιοχή της ριζόσφαιρας. Το RESYST έχει στόχο την διέγερση του ριζικού συστήματος των φυτών και τις αυτόχθονες ρίζες που αποικίζουν τα ωφέλιμα ριζοβακτηρια και μύκητες, σχεδιασμένο για χρήση και σε ασβεστούχα εδάφη, εδάφη με χαμηλή περιε κτικότητα σε οργανική ύλη.

ΧΡΗΣΗ

Ετήσιες καλλιέργειες υπέργειες και θερμοκηπίου: Φράουλες, τομάτα, αγγούρια, μελιτζάνα, πεπόνια, πιπεριές, καρπούζι, μαρούλι, φασόλια, κρεμμύδια, μπρόκολο, λαχανάκια βρυξελών, κουνουπίδι, λάχανο, σέλινο, σπανάκι, πατάτα, σπαράγγι, καρότο, μαϊντανός, κατσαρό λάχανο, αντίδι.

Γραμμικές και εκτατικές καλλιέργειες: Βαμβάκι, σόγια, καλαμπόκι, φυσικί, αράπικο, σακχαρότευτλα, γλυκοπατάτα, λυκίσκος, μέντα, καπνός, ηλίανθος, μηδική, γλυκό καλαμπόκι.

Οπωροφόρα: Πορτοκάλια, λεμόνια, λάιμ, γκρέιπ φρούτ, μανταρίνια, αμύγδαλα, καρύδια, κάστανα, μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, βερούκοκα, νεκταρίνια, κεράσια, αβοκάντο, σύκα, μάγκος, ακτινίδια, βατόμουρα, μύρtila, αμπέλια. Νεαρά φυτώρια.

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή του RESYST για πρώτη φορά: Συνιστάται η εφαρμογή 1,5 -2,0 λίτρα RESYST ανά στρέμμα πριν την μεταφύτευση στις περιπτώσεις που οι εδαφικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς. Η φύτευση συνιστάται να γίνεται μετά 10-15 ημέρες από την εφαρμογή του RESYST. Ακολουθούν τρεις(3) εφαρμογές με 1,5-2,0 λίτρα ανά στρέμμα και εφαρμογή κάθε 10-15ημέρες. Η πρώτη εφαρμογή μετά την μεταφύτευση γίνεται μαζί με το πρώτο πότισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΥΛΑΞΤΕΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

1 GAL (3,785 λίτρα)
4,278Kg

4X1GAL (4X3,785 λίτρα)
4X4,28Kg

2,5 GAL (9,46λίτρα)
10,69 Kg

2X2,5 GAL (2X9,46 λίτρα)
2X10,69 Kg

Resyst

**ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ
ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**
(Ρεζίστ)


**ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ
ΕΥΡΩΣΤΟΥ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.**

Υγρό Α.Τ. Μ(II) Π(III)
Υγρό Όργανο-ανόργανο Λίπασμα ιχνοστοιχείων
Βιοδιεγέρτης Π(VII)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαγγάνιο (Mn).....0,10 % w/w
συμπλοκοποιημένο με αμινοξέα
Ψευδάργυρος (Zn).....0,40% w/w
συμπλοκοποιημένο με αμινοξέα
Οργανική ουσία κατά προσέγγιση.....16,20% w/w
Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 0,500 mmhos / cm @1 γραμ / 100 ml απιονισμένου νερού.

Ολικός άνθρακας.....9,40% w/w
pH.....2,75 αδιάλυτο
Πυκνότητα.....1,13 κιλά/λίτρο

**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ:**

Μέσα από τα συστήματα άρδευσης-λίπανσης ή με διαβροχή του εδάφους. Χρησιμοποιήστε αρκετή ποσότητα νερού ώστε να υγρανθεί το έδαφος και να διεισδύσει το RESYST στο βάθος ανάπτυξης της ριζόσφαιρας (15-20 cm)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε το RESYST, μέσα από τα συστήματα υδρολίπανσης, η ριζοποτιστεί γύρω από την βάση των φυτών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ:

Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή πριν την φύτευση στα λαχανικά και τις εκτατικές καλλιέργειες όπως επίσης και στις δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αμπέλια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Μετά την επιτευξη των επιθυμητών συνθηκών στο έδαφος η εφαρμογή του RESYST προτείνεται να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εφαρμογών συνιστάται να είναι μεταξύ των 15-30 ημερών.

Η δόση εφαρμογής μπορεί να αυξηθεί σε πολύ δυσμενείς συνθήκες ή σε πολύ όξινα ή αλκαλικά εδάφη.

**ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

GROW  MORE®

15600 New Century Drive,
Gardena, CA, U.S.A. 90248
www.growmore.com

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ: **ΤΟΠΙΟ Α.Ε.**
4χλμ Ναυπλίου-Τολού 21100 Ναύπλιο Τηλ. 27520 97635 Fax: 27520 97636
topio@otenet.gr