

BIOCOZYME W.S.C

ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα **BIO-COZYME wsc**, είναι λιπάσματα νέου τύπου σε μορφή σκόνης αποξηραμένης δια ψεκασμού, που περιέχουν εκχυλίσματα φυκιών, κριθαριού και τριφυλλίου, αμινοξέα, σύμπλοκα σακχάρων, βιταμίνες, μπεταίνες, κυτοκίνες, φυσικούς χηλικούς και συμπλεκτικούς παράγοντες και μικροθρεπτικά.

Έχουν την εμφάνιση σκόνης (πούδρας) ανοικτού μπεζ χρώματος και είναι 100% υδατοδιαλυτά και σταθερά σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού.

Το pH κυμαίνεται μεταξύ 5.5 έως 6.5 (σε 5% απιονισμένο νερό). Είναι μη τοξικά, μη διαβρωτικά, και βιοαποδομούμενα.

Περιέχουν ωφέλιμα έξω συμβιωτικά νιτροβακτήρια (δια δεύσμευση αζώτου), 78 δισεκατομμύρια / λίμπρα και βακτήρια αύξησης διαλυτότητας του φωσφόρου 149 δισεκατομμύρια / λίμπρα. Τα βακτήρια αυτά επί πλέον προσκολλώνται στη νεαρή βλάστηση και τα καινούργια ριζίδια και βγάζουν ένα χαμηλού ειδικού βάρους υγρό το οποίο απωθεί έως και εκτοπίζει τα παθογενεί.

Σημείωση :Οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί λεπτομερώς με σκοπό τον έλεγχο και αποφυγή παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών .Για την παραγωγή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

BIOCOZYME W.S.C ALL PURPOSES

Συνολικό Άζωτο (N)	0,70%
0,70% Αμινοξί (NH ₃)	
Υδατοδιαλυτό Κάλι(K ₂ O)	5,00%
Μαγνήσιο	1,40%
Βόριο	0,20%
Χαλκός (Cu)	0,50%
Σίδηρος (Fe)	0,30%
Μαγγάνιο (Mn)	1,00%
Μολυβδένιο (Mo)	0,025%
Ψευδάργυρος (Zn)	2,00%
Χλώριο (Cl)	1,00%
Χουμικό οξύ,χουμικές ενώσεις και παράγωγα	8,00%
Έκχυλίσματα θαλασσίων φυκιών επεξεργασμένων με κρύο νερό	8, 50%
Βιταμίνες EC συμπλέγματος B, οργανικά οξέα, φυσικά σάκχαρα, αμινοξέα και υδατάνθρακες	1.40%

BIOCOZYME W.S.C + 10% ZINC

Συνολικό Άζωτο (N)	4,20%
4,20% Άζωτο από αμινοξέα	
Υδατοδιαλυτό Κάλι(K ₂ O)	5,00%
Ψευδάργυρος (Zn)	10,00%
Χουμικό οξύ,χουμικές ενώσεις και παράγωγα	8,00%
Χλώριο (Cl)	1,00%
Έκχυλίσματα θαλασσίων φυκιών επεξεργασμένων με κρύο νερό	8,50%
Βιταμίνες E,C συμπλέγματος B, οργανικά οξέα, φυσικά σάκχαρα, αμινοξέα και υδατάνθρακες	6,05%

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ:

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ: 1 χλγ σε 1000 λίτρα νερό

ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 200 γραμμάρια ανά στρέμμα.

BIOCOZYME W.S.C + 10% BORON

Συνολικό Άζωτο (N)	0,20%
0,20% Αμινοξί (NH ₃)	
Υδατοδιαλυτό Κάλι(K ₂ O)	5,00%
Βόριο (B)	10,0%
Χουμικό οξύ,χουμικές ενώσεις και παράγωγα	8,00%
Χλώριο (Cl)	1,00%
Έκχυλίσματα θαλασσίων φυκιών επεξεργασμένων με κρύο νερό	8,50%
Βιταμίνες EC συμπλέγματος B, οργανικά οξέα, φυσικά σάκχαρα, αμινοξέα και υδατάνθρακες	6,05%

BIOCOZYME W.S.C + 10% IRON

Συνολικό Άζωτο (N)	2,80%
2,80% Αμινοξί (NH ₃)	
Υδατοδιαλυτό Κάλι(K ₂ O)	5,00%
Σίδηρος (Fe)	10,00%
Χουμικό οξύ,χουμικές ενώσεις και παράγωγα	8,00%
Χλώριο (Cl)	1,00%
Έκχυλίσματα θαλασσίων φυκιών επεξεργασμένων με κρύο νερό	8,50%
Βιταμίνες E,C συμπλέγματος B, οργανικά οξέα, φυσικά σάκχαρα, αμινοξέα και υδατάνθρακες	6,05%

BIOCOZYME W.S.C + 10% Mn

Συνολικό Άζωτο (N)	4,60%
4,60 Άζωτο από αμινοξέα	
Υδατοδιαλυτό Κάλι(K ₂ O)	5,00%
Μαγγάνιο (Mn)	10,00%
Χουμικό οξύ,χουμικές ενώσεις και παράγωγα	8,00%
Χλώριο (Cl)	1,00%
Έκχυλίσματα θαλασσίων φυκιών επεξεργασμένων με κρύο νερό	8,50%
Βιταμίνες E,C συμπλέγματος B, οργανικά οξέα, φυσικά σάκχαρα, αμινοξέα και υδατάνθρακες	6,05%

